



UROCULTIVO

Recolección de la muestra

En caso de estar tomando antibióticos o diuréticos, se deberán suprimir 3 días antes de la prueba, (consultar con el médico).

-Niños y adultos que controlan esfínteres: La muestra de elección es el chorro medio miccional. El tiempo de retención deseado es de, por lo menos, 3 horas. (Primera orina de la mañana)

-Mujeres: Se debe higienizar la zona genital con agua y jabón, de adelante hacia atrás, secar con toalla limpia, y se debe colocar un tapón vaginal (torunda de gasa o algodón). Se elimina el primer chorro y se recolecta en frasco estéril la fracción siguiente. Se recomienda orinar separando los labios mayores.

-Hombres: Se debe retraer el prepucio e higienizar el glande y surco balanoprepucial con agua y jabón, y secar con toalla limpia. Se elimina el primer chorro y se recolecta en frasco estéril la fracción siguiente. Se desaconseja el uso de antisépticos, ya que pueden afectar el resultado del urocultivo, provocando un descenso en el recuento de colonias.

-Niños y adultos que no controlan esfínteres: No utilizar bolsas colectoras para el estudio de urocultivo. Recolectar al acecho: el método se aplica con los lactantes y es similar al descrito para los pacientes que controlan esfínteres.

La dificultad estriba en que se desconoce cual será el momento en que se va a producir la micción. El operador deberá esperar entonces a que la misma se produzca y recogerá en un frasco estéril lo que seguramente será la porción media del chorro miccional.

ANTE CUALQUIER DUDA, CONSÚLTENOS.

I-012-01-v01

**LABORATORIO SCAGLIA
MONTE GRANDE**

📞 Tel.: 4290.0510

✉️ labscaglia@gmail.com

**LABORATORIO CLINICA
MONTE GRANDE**

📞 Tel.: 4367.6760

✉️ laboratorio@cpmgsa.com.ar

**LABORATORIO SCAGLIA
CANNING**

📞 Tel.: 3751.6910

✉️ laboratorioscagliacanning@gmail.com